

HIPRADOG-7

Principio activo

Fracción liofilizada: Virus vivo parvovirus canina (CPV) cepa C-780916 $\geq 10^6$ DICT50; Virus vivo moquillo (CDV) cepa Lederle $\geq 10^4$ DICT50; Adenovirus vivo tipo 2 (CAV2) cepa Manhattan $\geq 10^4$ DICT50; Virus vivo Parainfluenza canino (CPIV) cepa Penn 103/70 $\geq 10^5$ DICT50

Fracción líquida: *Leptospira icterohaemorrhagiae* y *Leptospira canicola* inactivadas $\geq 10^9$ microorganismos de cada valencia.



Laboratorio

HIPRADOG

Categoría

BIOLOGICO

Descripción

Vacuna viva, Parvovirus, Moquillo, Hepatitis, Laringotraqueítis y Traqueobronquitis, en liofilizado inyectable; y Vacuna inactivada, Leptospirosis canina, en suspensión inyectable

Indicaciones

Perros: Prevención de Parvovirus, Moquillo, Hepatitis, Laringotraqueítis, Traqueobronquitis y Leptospirosis. La parvovirus, el moquillo, la hepatitis, la laringotraqueítis, la traqueobronquitis y la leptospirosis caninas son enfermedades que pueden afectar a perros de cualquier edad, llegando a producir incluso la muerte. En las primeras semanas de vida, la mayor parte de los animales están protegidos por los anticuerpos maternos. Al declinar éstos en las semanas subsiguientes, los animales se vuelven susceptibles a la infección. La vacunación sistemática de cachorros y adultos produce un nivel de anticuerpos frente a estas enfermedades de una magnitud suficiente para asegurar la protección de los animales. Además, en el caso de la leptospirosis, evitaremos que existan animales portadores asintomáticos que podrían ser un peligro potencial por el riesgo de transmisión de la enfermedad al hombre.

Especies indicadas

Perros.

Dosificación y vías de administración:

Dosificación:

Perros: 1 ml/perro, independientemente de su peso, edad, sexo y raza.

Trasvasar, mediante una jeringa, la fracción líquida al frasco que contiene la fracción liofilizada, asegurando una completa reconstitución de la vacuna, antes de proceder a su administración.

Es aconsejable administrar la primera vacuna a las 8 semanas y revacunar a las 12 semanas.

Se recomienda una dosis de recuerdo anual.



INVERSIONES GENERALES BRIVET SRL

av. America Norte 1635 Urb. Las Quintanas
La Libertad - Trujillo
(51) 932219044 / (51) 979232073
brivet@brivetperu.com
brivetperu.com

FICHA TÉCNICA

Vías de administración:

Subcutánea.

Contraindicaciones y limitaciones de uso

No usar la vacuna en animales con posibles parásitos intestinales, en estado de estrés o que estén incubando una enfermedad infectocontagiosa.

Como no se ha demostrado la inocuidad de esta vacuna en hembras gestantes, no se aconseja su utilización en estos animales.

Presentación

Envase 10 ds (fracción liofilizada + fracción líquida).