

Proceft LPU

Principio activo

Ceftiofur (como clorhidrato) 5g

Laboratorio

PROAGRO

Categoría

ANTIBIOTICO

Descripción

Antibiótico inyectable de amplio espectro, listo para usar. El Proceft es una cefalosporina de tercera generación con acción frente a bacterias gram (+) y gram (-), incluyendo cepas de estafilococos penicilinoresistentes.

Precaución:

Se recomienda realizar la aplicación tomando medidas de asepsia.

No administrar más de 15 ml por sitio de inoculación intramuscular.

Los animales pueden manifestar dolor luego de la administración IM.

Periodo de retiro :

Sin periodo de retiro en leche. Período de retiro en carne: 2 días.

Indicaciones

Bovinos: Tratamiento y control de la Enfermedad Respiratoria Bovina (fiebre del transporte), metritis, neumonías por *Pasteurella multocida*, *P. Haemolítica* y *Haemophilus somnus*. Afecciones podales (pietín o pododermatitis) asociado a *Fusobacterium necrophorum* y *Prevotella melaninogenica*.

Porcinos: Tratamiento y control de neumonía bacteriana asociada a *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida* y *Streptococcus suis*. Salmonelosis.

Especies indicadas

Bovinos y porcinos

Dosificación y vías de administración:

Dosificación:

Bovinos: 1,1 a 2,2 ml cada 50 kg. de peso vivo. (Corresponde a 1,1 a 2,2 mg/kg.p.v.).

Porcinos: 0,6 a 1 ml cada 10 kg. de peso vivo. (Corresponde a 1,1 a 2,2 mg/kg.p.v.).

Vías de administración :

Bovinos: subcutánea (SC) e intramuscular (IM).

Porcinos: intramuscular (IM)

Contraindicaciones y limitaciones de uso





INVERSIONES GENERALES BRIVET SRL

av. America Norte 1635 Urb. Las Quintanas
La Libertad - Trujillo
(51) 932219044 / (51) 979232073
brivet@brivetperu.com
brivetperu.com

FICHA TÉCNICA

En animales con hipersensibilidad a la droga.

Presentación

Frasco ampolla de 100 ml.